



The Royal College of Radiologists

# Ffurflen cydsynio i radiotherapi ar gyfer cancer yr ysgyfaint

Dim ond os yw'r claf dros 16 oed a bod ganddo'r galluedd i gydsynio y dylid defnyddio'r ffurflen hon. Os nad oes gan y claf y galluedd yn gyfreithiol, defnyddiwch ffurflen gydsynio amgen briodol gan eich ysbyty.

## Manylion y claf

Enw'r claf:

---

Dyddiad geni:

---

Dynodydd unigryw'r claf:

---

Enw'r ysbyty:

---

Oncolegydd ymgynghorol neu radiograffydd ymgynghorol cyfrifol:

---

Gofynion arbennig: e.e. trafnidiaeth, cyfieithydd ar y pryd, cymorth

---

## Manylion y radiotherapi

Math o radiotherapi:

Rhan o'r corff ac ochr:  
(Ticiwch fel y bo'n briodol)

Radiotherapi paladr allanol i'r frest/thoracs: gan gynnwys yr ysgyfaint, nodau lymff a thiwmorau thymig

- |   |   |   |
|---|---|---|
| <input type="checkbox"/> Ysgyfaint Chwith | <input type="checkbox"/> Ochr Chwith y Gwddf  | <input type="checkbox"/> Ochr Dde'r Gwddf |
| <input type="checkbox"/> Ysgyfaint De     | <input type="checkbox"/> Arall (nodwch) _____ |   |
| <input type="checkbox"/> Dwyochrol        |   |   |
| <input type="checkbox"/> Canolog          |   |   |

Nod y driniaeth:  
(Ticiwch fel y bo'n briodol)

- |  |
|--|
| <input type="checkbox"/> Gwellhaol – i roi'r cyfle gorau i chi wella'n llwyr   |
| <input type="checkbox"/> Neo-gynorthwyol – triniaeth a roddir cyn llawdriniaeth  |
| <input type="checkbox"/> Cynorthwyol – triniaeth a roddir ar ôl llawdriniaeth i leihau'r risg y bydd y cancer yn dychwelyd           |
| <input type="checkbox"/> Rheoli clefyd/lliniarol – i wella eich symptomau a/neu'ch helpu i fyw yn hirach ond nid i wella eich cancer |

Therapi gwrth-ganser systemig cydredol:  
(Ticiwch fel y bo'n briodol)

- |  |
|--|
| <input type="checkbox"/> Ie gyda _____ |
| <input type="checkbox"/> Na            |
- (Bydd ffurflen gydsynio ar wahân yn cwmpasu sgil-ffeithiau posibl y driniaeth hon)

Efallai y bydd gennych gwestiynau cyn dechrau eich radiotherapi, neu yn ystod neu ar ôl y driniaeth.

Rhoddir manylion cyswllt yma ar gyfer unrhyw ymholiadau pellach, pryderon neu os hoffech drafod eich triniaeth ymhellach.

---

## Sgil-efeithiau cynnar neu dymor byr posibl

Yn dechrau yn ystod radiotherapi neu'n fuan ar ôl cwblhau radiotherapi ac, fel arfer, yn diflannu o fewn dau i chwe mis ar ôl cwblhau radiotherapi. Mae'r amlderau yn rhai bras.

|  |  |
|--|--|
| <p><b>Disgwyliedig</b><br/>50%–100%</p>                        | <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> <b>Blinder ysgafn</b></li> <li><input type="checkbox"/> <b>Poen ysgafn wrth lyncu</b></li> <li><input type="checkbox"/> <b>Poen ar y croen, y croen yn cosi a newid yn lliw'r croen lle rhoddir triniaeth</b> – croen gwyn/<b>goleuach</b>: pinc, coch, yn dywyllach na'r ardal o amgylch; <b>croen brown</b>: goch neu'n dywyllach na'r ardal o amgylch; <b>croen du</b>: yn dywyllach na'r ardal o amgylch, y lliwiau yn newid rhwng melyn/porffor/llwyd</li> <li><input type="checkbox"/> <b>Colli gwallt dros dro lle rhoddir triniaeth</b></li> </ul>   |
| <p><b>Cyffredin</b><br/>10%–50%</p>                            | <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> <b>Blinder cymedrol i ddifrifol</b></li> <li><input type="checkbox"/> <b>Llid ysgafn ar yr ysgyfaint</b> a all arwain at ddiffyg anadl ysgafn, peswch neu newidiadau a welir ar sgan pelydr-x</li> <li><input type="checkbox"/> <b>Poen cymedrol i ddifrifol wrth lyncu</b></li> <li><input type="checkbox"/> <b>Cyfog ysgfan</b> – teimlo'n sâl</li> </ul>  |
| <p><b>Llai cyffredin</b><br/>Llai na 10%</p>                   | <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> <b>Diffyg anadl neu beswch (cymedrol i ddifrifol)</b> a all effeithio ar fywyd o ddydd i ddydd ac a achosir gan niwmonitis (llid dros dro yr ysgyfaint)</li> <li><input type="checkbox"/> <b>Cyfog neu chwydu cymedrol i ddifrifol</b></li> <li><input type="checkbox"/> <b>Risg o haint</b> a achosir drwy atal y system imiwneidd a chyfrif lymffosytâu isel</li> <li><input type="checkbox"/> <b>Arwydd Lhermitte</b> – newidiadau dros dro i fadrudyn y cefn sy'n peri i chi deimlo rhywbeth tebyg i sioc drydanol sydyn wrth blygu'r gwddf. Gallant ddigwydd dri i chwe mis ar ôl y driniaeth</li> </ul>              |
| <p><b>Anghyffredin</b><br/>Llai nag 1%</p>                     | <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> <b>Pesychu gwaed</b> – symiau bach fel arfer</li> <li><input type="checkbox"/> <b>Poen difrifol ar y croen a newidiadau lliw</b> – cochni ar groen gwyn a lliw tywyll cynnil, melyn/piws/llwyd ar groen brown a du</li> <li><input type="checkbox"/> <b>Cewch eich anfon i'r ysbyty er mwyn helpu i reoli eich symptomau</b></li> <li><input type="checkbox"/> <b>Anhawster wrth lyncu</b> a all olygu bod angen gosod tiwb bwydo dros dro ar ddechrau'r driniaeth neu yn ystod y driniaeth er mwyn sicrhau maeth a hydradiad digonol</li> <li><input type="checkbox"/> <b>Risg i fywyd</b> – anghyffredin iawn</li> </ul> |
| <p><b>Risgiau penodol i chi o ganlyniad i'ch triniaeth</b></p> | <p><b>Rwy'n cadarnhau</b> bod y sgil-efeithiau uchod wedi cael eu hesbonio i mi.</p>   |
|  | <p><b>Blaenlythrennau'r claf</b></p>   |

## Sgil-efeithiau hwyr neu dymor hir posibl

Gallant ddigwydd fisoedd neu flynyddoedd lawer ar ôl triniaeth radiotherapi a gallant fod yn barhaol. Mae'r amlderau yn rhai bras.

|  |   |                                      |
|--|---|--------------------------------------|
| <p><b>Disgwyliedig</b><br/>50%–100%</p>                        | <p><input type="checkbox"/> <b>Ffibrosis yr ysgyfaint</b> – creithiau ar yr ysgyfaint y gellir eu gweld ar sgan pelydr-x neu sgan tomograffi cyfrifiadurol (CT) nad ydynt yn achosi cynnydd sylweddol mewn diffyg anadl fel arfer</p>   |                                      |
| <p><b>Cyffredin</b><br/>10%–50%</p>                            | <p><input type="checkbox"/> <b>Diffyg anadl neu beswch yn gwaethygu</b></p> <p><input type="checkbox"/> <b>Llid tymor hir ar yr oesoffagws</b> sy'n achosi teimlad ysgafn o boen neu fod bwyd yn aros yn yr oesoffagws</p>  |                                      |
| <p><b>Llai cyffredin</b><br/>Llai na 10%</p>                   | <p><input type="checkbox"/> <b>Diffyg anadl neu beswch tymor hir</b> a achosir gan greithiau (ffibrosis) ar yr ysgyfaint y gellir eu gweld ar sgan pelydr-x neu CT. Gallai hyn olygu bod angen i chi gael ocsigen gartref</p> <p><input type="checkbox"/> <b>Llid tymor hir ar yr oesoffagws</b> sy'n achosi teimlad mwy difrifol o boen neu fod bwyd yn aros yn yr oesoffagws</p> <p><input type="checkbox"/> <b>Yr oesoffagws yn culhau</b> – creithiau sy'n achosi i'r oesoffagws gulhau</p> <p><input type="checkbox"/> <b>Risg o niwed i'r galon</b> – mae'r risg yn dibynnu ar leoliad y tiwmor</p> <p><input type="checkbox"/> <b>Yn fwy tebygol o dorri asgwrn lle rhoddir triniaeth radiotherapi</b></p>   |                                      |
| <p><b>Anghyffredin</b><br/>Llai nag 1%</p>                     | <p><input type="checkbox"/> <b>Heintiau cronig ar yr ysgyfaint</b> gan gynnwys crawniad</p> <p><input type="checkbox"/> <b>Risg o niwed i organau</b> gan gynnwys twll neu ffistwla</p> <p><input type="checkbox"/> <b>Risg o niwed i'r nerfau yn y breichiau/dwylo</b> a all achosi poen, diffyg teimlad neu oglais</p> <p><input type="checkbox"/> <b>Canser gwahanol lle rhoddir triniaeth</b></p> <p><input type="checkbox"/> <b>Isthyroidedd</b> – diffyg hormonau, a all olygu bod angen i chi gymryd meddyginiaeth</p> <p><input type="checkbox"/> <b>Isdduegedd</b> – nid yw'r dduwg yn gweithio mwyach sy'n lleihau imiwnedd ac a all olygu bod angen i chi gael brechiadau ychwanegol a gwrthfotigau proffylactig</p> <p><input type="checkbox"/> <b>Risg i fywyd</b> – anghyffredin iawn</p> |                                      |
| <p><b>Risgiau penodol i chi o ganlyniad i'ch triniaeth</b></p> |   |                                      |
|  | <p><b>Rwy'n cadarnhau</b> bod y sgil-efeithiau uchod wedi cael eu hesbonio i mi.</p>  | <p><b>Blaenlythrennau'r claf</b></p> |

Enw'r claf:

Dynodydd unigryw'r claf:

## Datganiad y gweithiwr iechyd proffesiynol

(i'w lenwi gan weithiwr iechyd proffesiynol sydd â gwybodaeth briodol am y driniaeth arfaethedig)

- Rwyf wedi trafod yr hyn y mae'r driniaeth yn debygol o'i gynnwys, amcanion bwriadedig y driniaeth hon a'i sgil-efeithiau.
- Rwyf hefyd wedi trafod manteision a risgiau unrhyw driniaethau amgen sydd ar gael gan gynnwys dim triniaeth.
- Rwyf wedi trafod unrhyw bryderon penodol sydd gan y claf hwn.

Rhodddwyd taflen wybodaeth i gleifion:  Do /  Naddo – Manylion:

Rhodddwyd copi o'r ffurflen gydsynio i'r claf:  Do /  Naddo

Llofnod:

Dyddiad:

Enw:

Teitl swydd

## Datganiad y claf

- Mae nodau a sgil-efeithiau posibl y driniaeth wedi'u hesbonio i mi ac rwyf wedi cael cyfle i drafod triniaeth amgen ac rwy'n cytuno i gael y driniaeth a ddisgrifir ar y ffurflen hon.
- Rwy'n deall na ellir gwarantu y bydd unigolyn penodol yn rhoi'r radiotherapi. Fodd bynnag, bydd yr unigolyn yn meddu ar arbenigedd priodol.
- Soniwyd wrthyf am driniaethau ychwanegol sy'n angenrheidiol cyn fy nhriniaeth neu a all fod yn angenrheidiol yn ystod fy nhriniaeth. Gall hyn gynnwys marciau parhaol ar y croen a ffotograffau i helpu i gynllunio a nodi triniaethau.
- Rwy'n cytuno y gall gwybodaeth a gesglir yn ystod fy nhriniaeth, gan gynnwys delweddau a'm cofnodion iechyd, gael eu defnyddio ar gyfer addysg, gwaith archwilio ac ymchwil. Bydd unrhyw wybodaeth a ddefnyddir yn ddiennw. Rwy'n ymwybodol y gallaf dynnu fy nghydsyniad yn ôl unrhyw bryd.

### Ticiwch os yn berthnasol

- Rwy'n cadarnhau nad oes risg y gallwn fod yn feichiog.
- Rwy'n deall na ddylwn feichiogi yn ystod y driniaeth.

**Noder:** os oes unrhyw bosibilrwydd eich bod yn feichiog, rhaid i chi ddweud wrth eich meddyg ysbty/gweithiwr iechyd proffesiynol cyn cael triniaeth gan y gall hyn arwain at niwed sylweddol i ffetws yn y groth. Nid yw testosteron a thriniaethau hormon eraill yn ddulliau atal cenhedlu.

- Rwy'n deall petawn yn parhau i smygu, y gallai gael effaith sylweddol ar y sgil-efeithiau y byddaf yn eu profi ac effeithiolrwydd fy nhriniaeth.

- Nid oes gennyf reolydd calon na diffibriliwr cardiaidd mewnblanadwy (ICD).

**neu**

- Mae gennyf reolydd calon a/neu ddiffibriliwr cardiaidd mewnblanadwy (ICD) ac mae'r risgiau sy'n gysylltiedig â hyn wedi'u hesbonio i mi.

Llofnod:

Enw'r claf:

Dyddiad:

### Datganiad:

- cyfieithydd ar y pryd
- tyst (lle y bo'n briodol)

- Rwyf wedi dehongli'r wybodaeth yn y ffurflen hon i'r claf hyd eithaf fy ngallu ac mewn ffordd sydd, yn fy marn i, yn ddealladwy iddo.

**neu**

- Rwy'n cadarnhau na all y claf lofnodi ond ei fod wedi cydsynio i gael y driniaeth.

Llofnod:

Enw:

Dyddiad:

### Cadarnhad o gydsyniad y claf

(I'w lofnodi cyn i'r radiotherapi ddechrau)

Rwy'n cadarnhau nad oes gennyf unrhyw gwestiynau pellach ac fy mod am gael y driniaeth.

Blaenlythrennau'r claf

Dyddiad: